



www.miladkhoy.com

www.miladkhoy.com



خون ریزی و لکه بینی
در بارداری

شهرستان خوی خیابان قاضی طباطبایی
تلفن : ۰۴۴۳۶۳۶۵۶۷۴ الی ۰۴۴۳۶۳۶۵۶۸۴

@mk.h.official

شهرستان خوی خیابان قاضی طباطبایی
تلفن : ۰۴۴۳۶۳۶۵۶۷۴ الی ۰۴۴۳۶۳۶۵۶۸۴

@mk.h.official



درمان

در موارد جدا شدن زودتر از موعد جفت باید هر چه زودتر بارداری خاتمه یابد.

در موارد پایین قرار گرفتن جفت با نظر پزشک استراحت و چک حرکات و ضربان قلب جنین و در صورت بیشتر شدن خونریزی ختم بارداری انجام شود.

نکته:

سن بارداری نیز در تصمیم گیری مهم است.

ثر مواردی که خونریزی و ترشحات خونی همراه با انقباض باشد نشانه شروع زایمان است که بهترین اقدام مراجعه زودتر به پزشک است که در صورت امکان با درمان دارویی دردها را کاهش داده و از زایمان زودتر از موعد جلوگیری شود و در صورت عدم درمان و قطع دردهای زایمان ختم بارداری داده می شود.

در کل انجام سونوگرافی و انجام نوار قلب جنین با نظر پزشک انجام شود.

نکته:

در مواردی که جفت جلوتر قرار گرفته است بهتر است بررسی سونوگرافی جهت مهاجرت جفتی انجام شود. (در هفته ۲۸ - ۳۲)

نکته:

خانم های با گروه خونی منفی که همسرشان دارای گروه خونی مثبت هستند بهتر است در صورت خونریزی و یا سقط جنین از آمپول روگام به تجویز پزشک استفاده کنند.



علائم

- * خونریزی کم در حد قاعدگی
- * درد شکم مشابه دردهای قاعدگی
- * اسهال و تهوع و استفراغ در بعضی مواقع پیشرفته که به علت خونریزی داخلی ایجاد می شود.

- * در سونوگرافی شکمی در حالی که میزان BHCG بیشتر از ۵۰۰۰ است ساک حاملگی در رحم دیده نمی شود و در سونوگرافی داخلی در حالی که میزان BHCG بیشتر از ۲۰۰۰ است ساک حاملگی در رحم دیده نمی شود.

خونریزی نیمه دوم بارداری

خونریزی در این مرحله می تواند علل مختلف داشته باشد:

- ۱ - جفت در محل پایین قرار دارد.
- ۲ - جفت زودتر از وقت جدا شده است.
- ۳ - نشانه شروع زایمان.

علائم

- * درد شکم
- * تغییر در صدای قلب جنین
- * انقباض رحمی
- * ترشحات خونی

خونریزی و لکه بینی در بارداری

خونریزی و لکه بینی در بارداری به دو دسته تقسیم می شود:

- ۱ - خونریزی های نیمه اول بارداری
 - ۲ - خونریزی های نیمه دوم بارداری
 - ۳ - خونریزی های نیمه اول بارداری
- خونریزی در مراحل اول اولیه بارداری می تواند به علل مختلف باشد.

مثلا: احتمال سقط قرار گرفتن جفت در قسمت پایین رحم و یا حاملگی خارج رحمی
نکته: ۹۰٪ جفتها زیر هفته ۲۶ پایین هستند.

درمان

در صورتی که احتمال سقط و قرار گرفتن جفت در قسمت پایینی رحم باشد استراحت و عدم انجام مقاربت و درمان دارویی می تواند موثر باشد.

اما در صورتی که لکه بینی و خونریزی به علت حاملگی خارج از رحم باشد سریعاً باید درمان جراحی و یا دارویی انجام شود و حاملگی خاتمه داده شود چون خطرات بسیار زیادی دارد.