



مراقبت پس از
شگستگی ها



www.miladkhoy.com

www.miladkhoy.com

شهرستان خوی خیابان قاضی طباطبایی

تلفن: ۰۴۳۶۳۶۵۸۴۰۰ - ۰۴۳۶۲۶۵۶۷۴

@mk.h.official



- ۳- در صورت تورم اندام گچ گیری شده یا تغییر رنگ و کم شدن یا از بین رفتن حس اندام سریعاً به پزشک خود مراجعه نمایید.
- ۴- ورزشهای تقویت عضلات اندام زیر گچ را بطور مرتباً نجام دهید تا قدرت عضلانی اندام حفظ شود. مانند شل و سفت کردن عضلات ران و زانو و مچ و ...
- ۵- در صورتی که گچ دچار تغییر رنگ یا بوی بد گردید، سریعاً پزشک خود را مطلع نمایید.



- ۲- تازمانيکه گچ خيس است، از فشار روی آن بپرهيزيد و اندام را در جريان هوا قرار دهيد تا گچ آن زودتر خشک شود.

- ۶- حرکات ورزشی که توسط فيزيوتراپ آموزش داده می شود را جداً دنبال نمایید تا قدرت عضلات ناحیه شکسته شده حفظ و روند التیام زخم نیز سریعتر گردد.

در صورت بروز هر یک از علائم زیر:

- دردی که به مسکن جواب ندهد
- رنگ پریدگی انتهایی عضو گچ گیری شده
- عدم وجود نبض
- فوراً به اورژانس مراجعه نمایید. (سندرم کمپارتمان)



- ۱- عضو عمل شده را حداقل تا یک هفته بالاتر از سطح قلب نگه داريد.
- ۲- به هنگام راه رفتن از عصا یا واکر استفاده نمایيد.



- ۳- هنگام پاين آمدن از تخت یا بستر بمدت ۴-۶ هفته وزن خود را روی عضو شکسته نيندازيد.
- ۴- در صورت نياز به دارو، داروهای خود را طبق دستور پزشک مصرف کنيد.
- ۵- از مواد غذائي حاوي کلسیم، پروتئین و ویتامين استفاده نمایيد.
- مانند (شیر ، ماست ، پنیر ، انواع گوشت ، سبزیجات ، میوه ها و حبوبات).