

### \*درد پستان

ترک خوردن نوک پستان اغلب به دلیل شیوه نادرست شیردهی می باشد اصلاح روش های شیردهی و آغوش گرفتن نوزاد و گذاشتن کیسه یخ ۲ تا ۳ دقیقه قبل شیر دادن و پاک کردن نوک پستان از بزاق نوزاد و مالیدن یک قطره از شیر مادر روی نوک سینه به کاهش درد و بهبود ترک خوردن سینه کمک می کند. در روزهای ۳ تا ۵ به دلیل افزایش حجم شیر پستان ها چهار احتقان می شوند که تخلیه هر ۲ ساعت و ماساز ملایم و گذاشتن کیسه آب گرم قبل شیردهی و کیسه یخ بعد شیردهی و مصرف مسکن می تواند مفید باشد.

### \* درمان یبوست

عدم اجابت مزاج ۲-۱ روز بعد زایمان طبیعی است.

استفاده زیاد از مایعات و رژیم غذایی حاوی فیبر مثل آلو و انگیر کمک کننده می باشد.

استفاده از شربت شیر منیزی نیز خوب می باشد

### \* خونریزی پس از زایمان

۱. به اندازه کافی استراحت داشته باشید باید از انجام تمرين های ورزشی هوازی ۶-۴ هفته پرهیز شود.
۲. مصرف آهن و ویتامین ها نا ۳ ماه پس از زایمان
۳. استفاده از رژیم غذایی متوازن
۴. محدود کردن چای و قهوه.
۵. میزان خونریزی تا ۳ روز اول در حد پرورد و سپس تا روز ۱۰ به حد لکه بینی میرسد.

در صورت تشدید خونریزی مراجعه به پزشک توصیه می شود

### \* تب پس از زایمان

لباس زیاد نپوشید در صورت داشتن تب مایعات زیاد بنوشید از داروهای ضد تب مانند استامینوفن استفاده کنید. در صورت احتقان پستان شیردهی را ادامه داده و پس از آن از کمپرس آب سرد استفاده کنید. به یاد داشته باشید تب میتواند اولين علامت یماری جدي پس از زایمان باشد.

[www.miladkhoy.com](http://www.miladkhoy.com)

نمایندگی میراث منیر (ع)  
طلوع آفتاب سلامت



آموزش خود مراقبتی به  
مادران پس از زایمان  
طبیعی

واحد آموزش به بیمار

شماره تماس: ۰۴۴۳۶۳۶۵۶۷۴-۸۴

#### \*درد و گرفتگی پاها:

استراحت و ماساز مالیم و گرمای موضعی و مسکن ها می تواند درد رارفع نماید.

داشتن رژیم حاوی پتاسیم و کلسیم مثل موز و لبیات برای کارکرد عضلات ضروری است.

ولی باید بخاطر داشت که درد و قرمزی و سفت شدن ساق پا به صورت یه طرفه نشان دهنده ایجاد لخته خون در عروق تحتانی است و باید سریع به پزشک مراجعه نمود.



#### \*افسردگی بعد زایمان

تغییرات خلق و خوپس از زایمان طبیعی است. سعی کنین احساسات خود را با همسرتان در میان بگذارید بقدر کافی بخواهید و برای رسیدگی به نوزاد از دیگران کمک بخواهید.

بقدر کافی غذا و مایعات بخورید و ورزش سبک انجام دهید. و از مصرف دارو بدون تجویز پزشک خودداری کنید

#### \*کنترل بارداری و سالمت جنین:

توصیه می شود تا ۳ هفته بعد زایمان آمیزش انجام نشود چون احتمال عفونت زیاد می باشد.

معمولاً قاعده‌گی ۶-۸ هفته پس از پایان شیردهی اغاز می‌شود ولی ممکن است تا ۴ هفته پس از زایمان نیز شروع شود. شیردهی روش خوبی برای فاصله گذاری بین بارداری ها می باشد.

شیردهی منجر به خشکی وزن و کاهش تمایل به نزدیکی می شود که موقتی می باشد.

**\* بهداشت محل بخیه ها :**  
باید محل بخیه هارا خشک و تمیز نگه دارید برای کاهش تورم از کمپرس آب سرد هر ۲ ساعت به مدت ۱۰ دقیقه استفاده کنید بخ را داخل کیسه گذاشته و کیسه را داخل پارچه نخی و روی زخم بگذارید.

سپس از کمپرس آب گرم استفاده کنید. ناحیه شرمگاهی از جلو به عقب باید تمیز شود استفاده از گرمای چراغ مطالعه نیز کمک کننده می باشد.

زود به زود پوشک و لباس زیر خود را عوض کنید و از بلند کردن اشیا سنگین خودداری کنید.

و رژیم غذایی خود را طوری رعایت نمایید که چهار بیوست نشوید و در صورت خروج ترشحات بدبو از محل بخیه ها حتما به پزشک مراجعه نمایید.